

# AKUT BARN

**OBS!** Dessa anvisningar skall förutom i Barnhälsovårdens Metodbok finnas väl synliga t.ex. på medicinskåp i rum där akutbehandling av barn kan bli aktuell.

Alla mottagningar som tar emot barn bör ha beredskap att hantera vissa akuta tillstånd. Sannolikheten för akut reaktion på de vacciner som vi ger på BVC är ytterst minimal.

Däremot är det inte ovanligt att man kommer in till BVC eller närmaste mottagning med ett barn som ute eller hemma fått t.ex. en allergisk reaktion, akut infektion eller kramper.

Nedanstående farmaka skall alltid finnas på BVC eller mottagning i akutlåda/väska eller för sjuksköterskan omedelbart tillgängligt medicinskåp:

Adrenalin injektionsvätska	1 mg/ml
Anapen Jr/EpiPen Jr	0,15 mg
Anapen/Epipen	0,30 mg
Betapred injektionsvätska	4 mg/ml
Solu-Cortef injektionsvätska	100 mg/ml
Betapred tabl	0,5 mg
Tavegyl oral lösning	50 µg/ml
Stesolid klysm	5 mg
Stesolid rektallösning	5 mg

## BEHANDLA UTAN DRÖJSMÅL.

Lämna inte barnet – kalla på hjälp.

Förbered ev. transport till akutmottagning och/eller sjukhus.

Ambulans och/eller Giftinformationscentralen: 112

### AKUT TELEFONLISTA:

#### Fyll i lokalt!

Närmaste Sjukhus/Akutmott: tfn:.....

Närmaste Barnklinik/mottagning: tfn:.....

Närmaste Vårdcentral: tfn:.....

## ÅTGÄRDER - BEHANDLING

### 1. VID LINDRIGA ÖVERKÄNSLIGHETSREAKTIONER

Enbart lokal svullnad och/eller klåda på injektionsplatsen.

Mixt. Tavegyl 50 µg/ml

Dosering	0,5 ml/kg kroppsvikt	1-3 år	5 ml
		4-10 år	10 ml

Övervaka patienten i minst 30 minuter.

### 2. ANAFYLAXI – CHOCK

- Lägg barnet ner – höj fotändan.
- Ge adrenalin (EpiPen Jr/EpiPen/AnaPen Jr/AnaPen).
- Kontrollera andning och cirkulation. Ge eventuellt syrgas.
- Larma.
- Ge kortison.
- Vid andnings- och cirkulationsstillestånd återuppliva.
- Kontrollera blodtryck fortlöpande.
- Sätt om möjligt i.v. infart.

#### Ge adrenalin

Preparat	Dosering	Övrig åtgärd
Inj Anapen Jr/ EpiPen Jr 0,15 mg/dos	0-ca 3 år (5-15 kg) en inj. = 0,15 mg	<b>Kontrollera:</b> Fri luftväg, andning, hjärtverksamhet. Larma!
Inj AnaPen/ EpiPen 0,3 mg/dos	3 år och äldre (> 15 kg) en inj. = 0,3 mg	Se ovan.

Tryck **autoinjektorn** mot **barnets lår** och dosen avges.

**Om ingen effekt inom 15 minuter eller när AnaPen/EpiPen saknas – ge adrenalin enligt nedan:**

Preparat	Dosering	Anmärkning
Inj Adrenalin 1 mg/ml.	0-5 mån: 0,1 mg = 0,1 ml 6-12 mån: 0,15 mg = 0,15 ml 1-2 år: 0,2 mg = 0,2 ml 3-7 år: 0,3 mg = 0,3 ml	<b>Vid behov:</b> Hjärt-lungräddning. Kontrollera blodtryck.

Ges djupt **s.c.** eller **i.m.**, helst i övre kroppshalvan.

## Ge kortison

<b>Preparat</b>	<b>Dosering</b>
Inj Betapred 4 mg/ml	0-4 år 4 mg = 1 ml 4-7 år 8 mg = 2 ml

Alternativt ges Solu-Cortef 100 mg/ml

I.v. om möjligt, annars i.m. – ges sakta.

Alternativt ges tabl Betapred 0,5 mg

0-ca 1 år 8 tabl = 4 mg, löst i vatten  
1-7 år 12 tabl = 6 mg, löst i vatten

## Vid krampanfall

<b>Preparat</b>	<b>Dosering</b>	<b>Anmärkning</b>
Stesolid klysma 5 mg	0-3 mån: ½ klysma = 2,5 mg 3 mån-2 år: 1 klysma = 5 mg 2 år och äldre: 2 klysma = 10 mg	Fria luftvägar.

Sprutas i ändtarmen.

Transport till sjukhus sker snarast. Behandlande sjuksköterska eller läkare bör följa med barnet.