


Preparat			Obero- ende av måltid					Delbar- het	Intas stående eller sittande
Amoxicillin			√					(X)	
Amoxicillin + klavulansyra	√							D	
Atovakvon	√							-	
Azitromycin			√			√		FASS	
Cefadroxil	√							FASS	
Ceftibuten (licens)		√						(X)	
Ciprofloxacin			√		√	√	√	(X)	
Doxycyklin	√			√	√	√	√	D	S
Doxycyklin (Oracea)		√		√	√	√	√	X	S
Erytromycin	√							(X)	
Etambutol			√				√		
Fenoximetylpenicillin	Barn	Vuxna						D	
Flukloxacillin		√						1/2 Ej 125 mg	
Flukonazol			√					(X)	
Fusidinsyra		√		√				X	
Itrakonazol								X	
Isoniazid (Tibinide)	Efter måltid	√		√		√	√	D	
Klaritromycin			√					X	



Tas med måltid




1 tim före eller 2 tim efter måltid




Alkohol ska undvikas



Risk för fotosensibilisering

 **Antacida** ska undvikas under behandlings-  
tiden.

 **Fe, Ca, Mg** ska undvikas under behandlings-  
tiden. Mejeriprodukter ska inte intas samtidigt.

### Delbarhet och övrig information

*Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig  
delas eller krossas.*

1/2 kan delas i två lika stora doser.





D kan delas för nedsväljning.

(X) preparat bör sväljas hela.

X får inte delas.

FASS se fass, beror på tillverkare.

S anger att läkemedlet ej ska intas  
i liggande ställning.

Preparat			Oberoende av måltid			Antacida	Fe, Ca, Mg	Delbarhet	Intas stående eller sittande
Kindamycin			✓					X	S
Levofloxacin			✓		✓	✓	✓	1/2	
Linezolid			✓	✓				FASS	
Lymecyklin	✓				✓	✓	✓	X	S
Metenamin			✓			✓		D	
Metronidazol			✓	✓				(X)	
Moxifloxacin			✓		✓	✓	✓	X	
Nitrofurantoin	✓							D	
Nystatin		✓							
Pivmecillinam			✓					(X)	
Posakonazol			✓					X	
Rifampicin		✓		✓		✓		X	
Rifaximin			✓					X	
Sulfametoxazol + trimetoprim	✓							D	
Tetracyklin		✓			✓	✓	✓	X	S
Trimetoprim			✓					D	
Vankomycin			✓					X	
Vorikonazol		✓			✓			X	



Tas med måltid



1 tim före eller 2 tim efter måltid



Alkohol ska undvikas



Risk för fotosensibilisering

✗ **Antacida** ska undvikas under behandlingstiden.

✗ **Fe, Ca, Mg** ska undvikas under behandlingstiden. Mejeriprodukter ska inte intas samtidigt.

### Delbarhet och övrig information

*Antibiotika ska i möjligaste mån aldrig delas eller krossas.*

1/2 kan delas i två lika stora doser.

D kan delas för nedsväljning.

(X) preparat bör sväljas hela.

X får inte delas.

FASS se fass, beror på tillverkare.

S anger att läkemedlet ej ska intas i liggande ställning.