

## När serologisk kontroll behövs inför mässlingsvaccination

Efter inventering av personalens skydd mot smitta kan serologi vara rimligt att kontrollera i följande fall.

- Graviditet – vaccination kontraindicerad
- Planerad graviditet inom 1 månad från planerad vaccination mot mässling
- Immunsuppression av sjukdom eller läkemedel
- Allergi som gör att vaccination kan innebära risk för allvarlig biverkan
- Annat tillstånd som kan innebära allvarlig biverkan av vaccination
- Annan orsak som kan försvåra genomförande av vaccination

Om serologi visar på god immunitet så behöver vaccination mot mässling inte genomföras. Om serologi visar på ingen eller bristande immunitet mot mässling får adekvata åtgärder vidtas.

Fråga efter immunitet mot mässling:

Provtagningsanvisning KML Gävle sjukhus:

<https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-var-d-tandvard/kunskapsstod-och-rutiner/diagnostik/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar/m/morbilli2/>  
<https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-var-d-tandvard/kunskapsstod-och-rutiner/diagnostik/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar/m/Morbilli/>

Provtagningsanvisning Akademiska sjukhuset:

[Mässlingvirus antikroppar, serum](#)  
<http://labhandboken.u5054800.fsdata.se/>

*Detta dokument hanterar inte immunitet mot påssjuka eller röda hund.*

Shah Jalal  
Smittskyddsläkare Region Gävleborg