

Riktlinjer vid avlägsnande av visdomstand

1. Visdomständer *utan kliniska symtom eller radiologiska tecken på patologi*

Ingen behandling vid

- Total benretention oavsett ålder
- Total mjukvävnadsretention – patienter över 25 år

Ingen behandling men klinisk och radiologisk kontroll vid

- Total mjukvävnadsretention – patienter under 25 år
- Partiell retention – patienter över 25 år

Operativt avlägsnande bör övervägas vid

- Partiell retention – patienter under 25 år, vid mesioangulär vinkel (>50 grader) och bred anläggningsyta
- Lämplig beslutspunkt 23-24 års ålder

2. Visdomständer med *kliniska symtom, radiologiska tecken på patologi eller övriga terapeutiska indikationer*

Operativt avlägsnande alt kausal behandling

- Samtliga retentionsgrader – oavsett ålder
- Lämplig terapi avgörs från fall till fall

3. Fall där profylaktiskt avlägsnande är motiverat

- Strålning mot visdomstandsregionen
- Käkfraktur där 8:an förhindrar/försvårar reposition eller är uppenbar infektionsrisk
- Immunosupprimerade patienter där tanden kan sonderas i fickan
- Partiellt retinerade tänder inför infektionskänslig kirurgi
- Inför ortognatkirurgi där visdomstanden interfererar med osteotomisnitten